

Qu'est-ce qui peut tomber à l'examen ?

Référence :

voir l'item I - 3 - Q 33,
traité dans notre numéro
du 15 juin 2007

(Rev Prat 2007;57[11]:1245-54)

Seuls des éléments
de réponse aux questions,
fournis par l'auteur,
vous sont communiqués.
Cependant, selon les
recommandations du CNCI,
vos réponses devront être
« rédigées » en faisant
des phrases
et des paragraphes.

Remerciements

Dr Stéphanie Pannier,
Dr Dominique Moulies,
Pr Christophe Glorion

Service orthopédie-
traumatologie, hôpital
Necker-Enfants malades,
75015 Paris, France

Vous êtes appelé pour examiner un nourrisson à la maternité. Il est né après une grossesse de 36 semaines, en position de siège, avec un poids de 3 200 g. La sœur de la mère a été traitée pour une luxation congénitale dans sa petite enfance.

■ QUESTION N° 1

Quels signes d'examen vous font suspecter une luxation congénitale de hanche ?

■ QUESTION N° 2

Quelles sont les 3 situations pathologiques possibles ?

■ QUESTION N° 3

Par quel examen complémentaire confirmez-vous ce diagnostic ?

■ QUESTION N° 4

Quels sont les principes du traitement ?

■ QUESTION N° 5

Quels méthodes et moyens sont utilisés pour le traitement ?

■ QUESTION N° 6

Quelle est la surveillance du traitement ?

La surveillance du traitement est essentielle. D'abord clinique par la surveillance de la bonne tolérance du traitement (absence de pleurs, mobilité facile et indolore des hanches). Puis par l'imagerie, toute mise en place d'un appareil d'abduction doit être contrôlée par une radiographie ou par une échographie.

■ RÉPONSE N° 6

Méthodes ambulatoires : l'angage en abduction (l'ange calin), coussin souple, harnais de Pavlick.

■ RÉPONSE N° 5

Mettre la hanche dans la posture de recentrage : abduction et rotation interne.

■ RÉPONSE N° 4

Par une échographie de hanche.

■ RÉPONSE N° 3

La hanche est luxable, la hanche est luxée et irréductible, la hanche est luxée et irréductible.

■ RÉPONSE N° 2

L'attitude asymétrique du bassin, l'asymétrie des plis à la racine de la cuisse, la limitation de l'abduction d'une hanche ou des 2, la mise en évidence d'un resaut.

■ RÉPONSE N° 1

Éléments de réponse

Erratum

Dans l'article du Pr Bernard Canaud intitulé « Élévation de la créatininémie – Orientation diagnostique » (Partie III-Q 310) et paru dans la rubrique Références universitaires de *La Revue du Praticien* (Rev Prat 2008;58[16]:1837-46), une erreur est survenue. Page 1840, première colonne, avant-dernier paragraphe, il fallait lire :

« Si la formule de Cockcroft représente la référence dans ce domaine, elle tend néanmoins à **sous-estimer** la filtration glomérulaire... ».